

## ヒブ（インフルエンザ菌b型）

対象者：生後2ヶ月から5歳未満までのお子さん

標準的な接種開始期間は、生後2ヶ月から7ヶ月未満です。生後2ヶ月を過ぎたら、早目に接種しましょう。

接種方法：接種開始時の年齢により接種方法が異なります。

### ●接種開始が生後2ヶ月から7ヶ月未満の場合（標準的な接種方法）

回数	接種間隔等
1回目	生後2ヶ月から7ヶ月未満で接種開始
2回目	1回目接種後27日以上、標準的には56日までの間隔をおく
3回目	2回目接種後27日以上、標準的には56日までの間隔をおく
追加（4回目）	3回目接種後7ヶ月以上、標準的には13ヶ月までの間隔をおく

\*ただし、2回目および3回目の接種は生後12ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。追加接種は、初回最後の接種終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。

### ●接種開始が生後7ヶ月から1歳未満の場合

回数	接種間隔等
1回目	生後7ヶ月から12ヶ月未満の場合
2回目	1回目接種後27日以上、標準的には56日までの間隔をおく
追加（3回目）	2回目接種後7ヶ月以上、標準的には13ヶ月までの間隔をおく

\*ただし、2回目の接種は生後12ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。追加接種は、初回最後の接種終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。

### ●接種開始が生後1歳から5歳未満の場合

1回接種

## 小児用肺炎球菌

対象者：生後2ヶ月から5歳未満までのお子さん

標準的な接種開始期間は、生後2ヶ月から7ヶ月未満です。生後2ヶ月を過ぎたら、早目に接種しましょう。

接種方法：接種開始時の年齢により接種方法が異なります。

### ●接種開始が生後2ヶ月から7ヶ月未満の場合（標準的な接種方法）

回数	接種間隔等
1回目	生後2ヶ月から7ヶ月未満で接種開始
2回目	1回目接種後27日以上の間隔をおく
3回目	2回目接種後27日以上の間隔をおく（標準的には生後12ヶ月までに接種する）
追加（4回目）	生後12ヶ月に至った日以降に、3回目接種後60日以上の間隔をおく。（標準的には生後12ヶ月から15ヶ月になる前日までの間に接種する）

\*ただし、2回目および3回目の接種は生後24ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。また、2回目の接種は生後12ヶ月までに行い、それを超えた場合は3回目の接種は行わず、追加接種を行います。

### ●接種開始が生後7ヶ月から1歳未満の場合

回数	接種間隔等
1回目	生後7ヶ月から12ヶ月未満で接種開始
2回目	1回目接種後27日以上の間隔をおく（標準的には生後12ヶ月までに接種する）
追加（3回目）	生後12ヶ月に至った日以降に、2回目接種後60日以上の間隔をおく。

\*ただし、2回目の接種は生後24ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。

### ●接種開始が生後1歳から2歳未満の場合

60日以上の間隔において2回接種

### ●接種開始が生後2歳から5歳未満の場合

1回接種

## B型肝炎

対象者：生後1歳に至るまでのお子さん

標準的な接種開始期間は、生後2ヶ月から9ヶ月未満です。生後2ヶ月を過ぎたら、早目に接種しましょう。

### 接種方法

回数	接種間隔等	
1回目	1歳に至るまで (標準的には生後 2ヶ月から9ヶ月 に至るまで)	
2回目		1回目接種後27日以上の間隔をおく
3回目		1回目接種後139日以上の間隔をおく (かつ2回目から6日以上の間隔をおく)

## 4種混合

対象者：生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満までのお子さん

ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオの計4回の接種です。

### 接種方法

回数	接種間隔	標準接種年齢
初回1回目		生後3ヶ月から 1歳に達するまでの期間
初回2回目	初回1回目接種後20日以上、標準的には、56日までの間隔で接種	生後3ヶ月から 1歳に達するまでの期間
初回3回目	初回2回目接種後20日以上、標準的には、56日までの間隔で接種	生後3ヶ月から 1歳に達するまでの期間
初回追加	初回3回目接種後、標準的には、12ヶ月以上18ヶ月までの間隔で接種	

## 2種混合

対象者：満11歳から13歳未満のお子さん

ジフテリア・破傷風の2種混合の予防接種です。

### 接種方法

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
1回	満11歳から13歳未満	満11歳から12歳未満（小学校6年生の8月頃に予診票を送付します。）

## 3種混合

現在、3種混合ワクチンは製造していませんので、3種混合予防接種が終了していない方は、4種混合での対応になります。

詳細は、健康づくり課までお問合せ下さい。

## 不活化ポリオ

現在、不活化ポリオの接種は、単独での不活化ポリオ接種か、4種混合ワクチンでの接種となっております。

4回の接種が必要です。

詳細は、健康づくり課までお問合せ下さい。

## BCG

### 接種回数

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
1回	生後1歳に至るまでの間	生後5ヶ月に達した時から生後8月に達するまでの期間

## 水痘（水ぼうそう）

対象者：生後12ヶ月から36ヶ月（3歳）未満までのお子さん

### 接種方法

回数	法定接種年齢及び間隔	標準接種年齢及び間隔
1回目	生後12ヶ月から36ヶ月未満	生後12ヶ月から15ヶ月未満
2回目	1回目の接種終了後3ヶ月以上の間隔をおく	1回目の接種終了後6ヶ月から12ヶ月までの間隔をおく
<b>*注意事項</b> 任意接種で既に水痘予防接種をしたお子さんは、接種した回数分を接種完了とみなします。		

## 麻しん風しん混合

第1期対象者：生後12ヶ月から24ヶ月未満までのお子さん

第2期対象者：5歳以上7歳未満であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までのお子さん

### 接種方法

回数	法定接種年齢	備考
第1期	生後12ヶ月から24ヶ月未満	1歳になったら、できるだけ早目に接種
第2期	5歳以上7歳未満であって、小学校就学の始期に達する日の前日まで	小学校就学前年度の8月頃に予診票を送付します。

## 日本脳炎

### 日本脳炎ワクチンの積極的な接種勧奨再開について

平成17年度から21年度まで、日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常どおり受けられるようになっています。

#### 接種方法

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
1期初回1回目	生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満	3歳
1期初回2回目 * 1期初回1回目接種後6日以上、標準的には、28日までの間隔で接種	生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満	3歳
1期初回追加 * 1期初回2回目接種後6ヶ月以上、標準的には、おおむね1年の間隔で接種	生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満	4歳
2期	満9歳以上13歳未満	満9歳から10歳未満

\*平成17年度から21年度に日本脳炎の予防接種の勧奨を差し控えていたため、影響を受けたお子さんの接種方法については健康づくり課へお問い合わせ下さい。

## 子宮頸がん

### 子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて (お知らせ)

子宮頸がん予防ワクチンの接種については、因果関係は不明ながら重い副反応が報告されており、現在調査中であります。厚生労働省からの勧告により平成25年6月14日より積極的な接種勧奨を差し控えることとなりました。現在も定期予防接種としての接種が可能ですが、接種に当たっては、その有効性と接種による副反応が起こるリスクを十分理解した上で受けるようにして下さい。積極的な接種勧奨の再開については、情報が入り次第、ホームページ等でお知らせいたします。

対象者：小学校6年から高校1年生に相当する年齢の女性  
標準的な接種期間は、中学校1年生です。

接種回数        3回