

ロタウイルス

対象者

令和2年8月1日以降に生まれ、次のアとイに該当するお子さんです。

(※使用するワクチンによって対象者・回数・摂取量が違うので注意する。)

ア.経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合：出生6週0日後から24週0日後までの間にあるお子さん

イ.5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合：出生6週0日後から32週0日後までの間にあるお子さん

標準的な接種開始時期は、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間です。

接種方法

接種するワクチンによって接種方法が異なります。

ア. 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合

回 数	接 種 間 隔 等
1回目	出生2月に至った日から14週6日後までに接種開始
2回目	1回目接種後27日以上の間隔をおく

イ.5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合

回 数	接 種 間 隔 等
1回目	出生2月に至った日から14週6日後までに接種開始
2回目	1回目接種後27日以上の間隔をおく
3回目	2回目接種後27日以上の間隔をおく

ヒブ（インフルエンザ菌b型）

対象者

生後2ヶ月から5歳未満までのお子さん

標準的な接種開始期間は、生後2ヶ月から7ヶ月未満です。生後2ヶ月を過ぎたら、早目に接種しましょう。

接種方法

接種開始時の年齢により接種方法が異なります。

接種開始が生後2ヶ月から7ヶ月未満の場合（標準的な接種方法）

回 数	接 種 間 隔 等
1回目	生後2ヶ月から7ヶ月未満で接種開始
2回目	1回目接種後27日以上、標準的には56日までの間隔をおく
3回目	2回目接種後27日以上、標準的には56日までの間隔をおく
追加（4回目）	3回目接種後7ヶ月以上、標準的には13ヶ月までの間隔をおく

＊ただし、2回目および3回目の接種は生後12ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。追加接種は、初回最後の接種終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。

接種開始が生後7ヶ月から1歳未満の場合

回 数	接 種 間 隔 等
1回目	生後7ヶ月から12ヶ月未満の場合
2回目	1回目接種後27日以上、標準的には56日までの間隔をおく
追加（3回目）	2回目接種後27日以上、標準的には13ヶ月までの間隔をおく

＊ただし、2回目の接種は生後12ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。追加接種は、初回最後の接種終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。

接種開始が生後1歳から5歳未満の場合

1回接種

小児用肺炎球菌

対象者

生後 2 ヶ月から 5 歳未満までのお子さん

標準的な接種開始期間は、生後 2 ヶ月から 7 ヶ月未満です。生後 2 ヶ月を過ぎたら、早目に接種しましょう。

接種方法

接種開始時の年齢により接種方法が異なります。

接種開始が生後 2 ヶ月から 7 ヶ月未満の場合（標準的な接種方法）

回 数	接 種 間 隔 等
1 回目	生後 2 ヶ月から 7 ヶ月未満で接種開始
2 回目	1 回目接種後 2 7 日以上の間隔をおく
3 回目	2 回目接種後 2 7 日以上の間隔をおく（標準的には生後 1 2 ヶ月までに接種する）
追加（4 回目）	生後 1 2 ヶ月に至った日以降に、3 回目接種後 6 0 日以上の間隔をおく。（標準的には生後 1 2 ヶ月から 1 5 ヶ月の間に接種する）

*ただし、2 回目および 3 回目の接種は生後 2 4 ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。また、2 回目の接種は生後 1 2 ヶ月までに行い、それを超えた場合は 3 回目の接種は行わず、追加接種を行います。

接種開始が生後 7 ヶ月から 1 歳未満の場合

回 数	接 種 間 隔 等
1 回目	生後 7 ヶ月から 1 2 ヶ月未満で接種開始
2 回目	1 回目接種後 2 7 日以上の間隔をおく（標準的には生後 1 2 ヶ月までに接種する）
追加（3 回目）	生後 1 2 ヶ月に至った日以降に、2 回目接種後 6 0 日以上の間隔をおく。

*ただし、2 回目の接種は生後 2 4 ヶ月までに行い、それを超えた場合は行わず、追加接種を行います。

接種開始が生後 1 歳から 2 歳未満の場合

60日以上の間隔をおいて2回接種

接種開始が生後2歳から5歳未満の場合

1回接種

4種混合

ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオの計4回の接種です。

対象者

生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満までのお子さん

接種方法

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
初回1回目	生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満	生後3ヶ月から1歳
初回2回目 *初回1回目接種後20日以上、標準的には、56日までの間隔で接種	生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満	生後3ヶ月から1歳
初回3回目 *初回2回目接種後20日以上、標準的には、56日までの間隔で接種	生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満	生後3ヶ月から1歳
初回追加 *初回3回目接種後、標準的には、12ヶ月以上18ヶ月までの間隔で接種	生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満	1歳6ヶ月から2歳6ヶ月

2種混合

ジフテリア・破傷風の2種混合の予防接種です。

接種方法

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
1回	満11歳から13歳未満	満11歳から12歳未満（12歳になる年度の9月頃に予診票を送付します。）

3種混合

現在、3種混合ワクチンは製造していませんので、3種混合予防接種が終了していない方は、4種混合での対応になります。
詳細は、健康づくり課までお問合せ下さい。

不活化ポリオ

現在、不活化ポリオの接種は、単独での不活化ポリオ接種か、4種混合ワクチンでの接種となっております。
4回の接種が必要です。
詳細は、健康づくり課までお問合せ下さい。

B C G

接種回数

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
1回	生後1歳に至るまでの間	生後5ヶ月に達した時から生後8月に達するまでの期間

水痘（水ぼうそう）

平成26年10月1日から予防接種法に基づく定期予防接種になりました。
対象者
生後12ヶ月から36ヶ月（3歳）未満までのお子さん
接種方法

回数	法定接種年齢及び間隔	標準接種年齢及び間隔
1回目	生後12ヶ月から36ヶ月未満	生後12ヶ月から15ヶ月未満
2回目	1回目の接種終了後3ヶ月以上の間隔をおく	1回目の接種終了後6ヶ月から12ヶ月までの間隔をおく

＊注意事項

任意接種で既に水痘予防接種をしたお子さんは、接種した回数分を接種完了とみなします。

麻しん風しん混合

接種回数・接種年齢

回数	法定接種年齢	備考
第1期	生後12ヶ月から24ヶ月未満	1歳になったら、できるだけ早目に接種
第2期	5歳以上7歳未満であって、小学校就学の始期に達する日の前日まで	小学校就学前年度の9月頃に予診票を送付します。

日本脳炎

日本脳炎ワクチンの積極的な接種勧奨再開について

平成17年度から21年度まで、日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常どおり受けられようになっています。

接種方法

回数	法定接種年齢	標準接種年齢
1期初回1回目	生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満	3歳
1期初回2回目 * 1期初回1回目接種後6日以上、標準的には、28日までの間隔で接種	生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満	3歳
1期初回追加 * 1期初回2回目接種後6ヶ月以上、標準的には、おおむね1年の間隔で接種	生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満	4歳
2期	満9歳以上13歳未満	満9歳から10歳未満

*平成17年度から21年度に日本脳炎の予防接種の勧奨を差し控えていたため、影響を受けたお子さんの接種方法については健康づくり課へお問い合わせ下さい。